

Patiëntgegevens

BSN* _____

ACHTERNAAM* _____

VOORNAAM / VOORLETTERS* _____

GESLACHT* ☐ man ☐ vrouw

GEBORTE DATUM* _____

STRAATNAAM + HUISNR _____

POSTCODE + WOONPLAATS _____

ZORGVERZEKERAR + POLISNR _____

UW REFERENTIENUMMER _____

**verplicht veld*

UMC Utrecht
Centraal Diagnostisch Laboratorium
Loket Externe Monsterontvangst
Huispostnummer G03.330
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Telefoonnummer: 088 75 588 26
Website: www.cdi-umcu.nl

De dienstdoende klinisch chemicus is bereikbaar via
de telefooncentrale van het UMC Utrecht: 088 75 555 55

(in te vullen door laboratorium)

Datum ontvangst:-.....-..... Tijd ontvangst: : uur

Let op: download dit formulier voor optimale werking

Contactgegevens aanvrager

Naam organisatie _____
Adres _____

Naam arts _____
Telefoonnummer _____
Faxnummer* _____

Monsterinformatie

Afnamedatum:-.....-.....

Afnametijd: : uur

**rapportage per fax alleen op aanvraag*

Stolling algemeen

- ☐ Anti-Xa (LMWH) ●
 geneesmiddel: _____
- ☐ Rivaroxaban (anti-Xa) ●
- ☐ Apixaban (anti-Xa) ●
- ☐ Dabigatran (dTT) ●

Stolfactoren

- ☐ Fibrinogeen antigeen ●
- ☐ Factor II ●
- ☐ Factor V ●
- ☐ Factor VII ●
- ☐ Factor VIII chromogeen ●
- ☐ Factor IX ●
- ☐ Factor X ●
- ☐ Factor XI ●
- ☐ Factor XII ●
- ☐ Factor XIII ●
- ☐ Antiplasmin ●
- ☐ Plasminogeen act ●

Stolling vWF/FVIII

- ☐ vWF-antigeen ●
- ☐ vWF-ristocetine cofactor act ●
- ☐ vWF-multimeren (inclusief vWF-ag) ●
- ☐ vWF-collageenbinding ●

Stolling vWF/FVIII (vervolg)

- ☐ Anti-vWF ●
- ☐ vWF/FVIII-binding (inclusief FVIII en vWF-ag) ●
- ☐ vWF-protease (ADAMTS13) ●
- ☐ Factor VIII one-stage ●
- ☐ Anti-FVIII ●
- ☐ Anti-FIX ●

Stolling trombose

- ☐ LAC ●
- ☐ Anti-cardiolipine ●
- ☐ Anti-β2 GP-1 ●
- ☐ APC resistentie ●
- ☐ Prot-C act. (inclusief INR) ●
- ☐ Prot-S act. (inclusief INR) ●
- ☐ Antitrombine ●

Trombose DNA

- ☐ Factor V-Leiden ●
- ☐ Protrombine mutatie ●
- ☐ MTHFR (A1298C en C677T) ●

Trombocyten

- ☐  ADP/ATP ●
- ☐  Aggregatie ADP/Col/Epi/AA/TRAP/U466 ●
- ☐  Aggregatie ristocetine ●
- ☐  Spontane aggregatie ●

Hemoglobinopathie

- ☐ Hb-diagnostiek (HPLC) HbA2, HbF, HbS ●
- ☐ α-thalassemie (DNA) ●
- ☐ β-thalassemie+Hb-varianten (DNA) ●

Hemolyse

- ☐ Plasma-Hb ● (geen gelbuis)
- ☐ Haptoglobine ● ● (geen gelbuis)
- ☐ Foetale cellen ● (6 ml, geen gelbuis)

Anemie-vervolgonderzoek

- ☐ Zink protoporphyrine ●
- ☐ EPO ●
- ☐ Sol. transferrine receptor ●
- ☐ Methylmalonzuur ● (bij Vit B12 deficiëntie)
- ☐ Hepcidine ●

Klik op  voor meer informatie.

Standaard hoeveelheid materiaal, tenzij anders vermeld: min. 1 mL

● Serum ● LiHep-volbloed ● EDTA-volbloed ● EDTA-plasma ● LiHep-plasma ● Citraatplasma ● Na-citraat Sarstedt

Patiëntgegevens

BSN

ACHTERNAAM

GEBOORTEDATUM

Enzymen
☒ Glycolytische enzymen (ander formulier)

- ☐ Aldolase ●
- ☐ AF-isoenzymen ●
- ☐ ACE ●

Metaboliëten

- ☐  Pyruvaat ● (onteiwit)
- ☐  3-keto-boterzuur ● (onteiwit)
- ☐  3-OH-boterzuur ● (onteiwit)

Eiwitten

- ☐ Viscositeit ●
- ☐ α1-antitrypsine ●
- ☐ Ceruloplasmine ●
- ☐ SHBG ●

Feces

- ☐ Calprotectine
- ☐ Elastase
- ☐ α1-antitrypsine
- ☐  Galzure zouten
- ☐  Vet
- ☐ Natrium/kalium

Lipiden

- ☐ Lp(a) ●
- ☐ Apo A1 ●
- ☐ Apo A2 ●
- ☐ Apo B ●
- ☐ Apo E ●
- ☐ Vrije vetzuren ●
- ☐ LDL-cholesterol (kwantitatief) ●
- ☐ Apo E genotype ●

Hypofyse/bijnier

- ☐ ACTH ● (afname op ijs)
- ☐ Androsteendion (LC-MSMS) ●
- ☐ DHEA (LC-MSMS) ●
- ☐ DHEA-sulfaat ●
- ☐ 17OH-progesteron (LC-MSMS) ●
- ☐ 11-deoxycortisol (LC-MSMS) ●
- ☐  Cortisol (speeksel)

Calciummetabolisme

- ☐ 1,25-di-OH-vitamine D ●
- ☐ 25-OH-vitamine D ●
- ☐ PTH ●

Geslachtshormonen/fertiliteit

- ☐ AMH ●
- ☐ Oestron (E1) ●
- ☐ Oestradiol (E2) ●
- ☐ Testosteron ●
- ☐ Vrij testosteron ●

Hypertensie

- ☐ Aldosteron (LC-MSMS) ●
- ☐ Renine antigeen ●
- ☐ (Nor)metanefrine ●

Schildklier

- ☐ Totaal T3 ●
- ☐ Vrij T3 ●

Vitamines

- ☐ Vitamine B1 ●
- ☐ Vitamine B6 ●

Tumormarkers

- ☐ Calcitonine ●
- ☐ Gastrine ● (afname op ijs)
- ☐ Pro-IGFII / IIE[68-88]-peptide ●
- ☐ Thyreoglobuline + Tg a.l. ●
- ☐  VIP (aprotininebuis, afname op ijs)
- ☐ VEGF-D ●
- ☐ Serotonine ●
- ☐ S-100B ●

Groei

- ☐ Groeihormoon ●
- ☐ IGF-1 ●
- ☐ IGFBP-3 ●
- ☐ IGF-2 ●

Diabetes

- ☐ C-peptide ●
- ☐ Insuline ●
- ☐ Proinsuline ●
- ☐ Fructosamine ●

Overige materialen

- ☐  Kniepunctaat
- ☐  BTP (β trace protein)
- ☐  Zweet
- ☐  (Nier)steenanalyse (IR)
- ☐ (Nor)metanefrine (urine)
- ☐ Oxaalzuur (urine)
- ☐ Citraat (urine)

Overig onderzoek / opmerkingen

 Klik op  voor meer informatie.

Standaard hoeveelheid materiaal, tenzij anders vermeld: min. 1 mL

● Serum ● LiHep-volbloed ● EDTA-volbloed ● EDTA-plasma ● LiHep-plasma ● Citraatplasma ● Na-citraat Sarstedt