

Lokaal infiltratie

Triggerpoint

Indicatie

Pijnpunten (triggerpoints) worden veroorzaakt door een overgevoelige of een overgeprikkelde zenuw.

Plaats

Deze pijnpunten kunnen over het hele lichaam verspreid zijn en pijnlijk zijn bij aanraken.

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt en onder controle bent bij de trombosedienst, moet u met de arts overleggen of u enkele dagen voor de behandeling met deze medicijnen moet stoppen.

Overgevoeligheid voor verdovingsvloeistof of pleisters graag melden aan de anesthesioloog of verpleegkundige.

Behandeling

Op verzoek van de anesthesioloog wijst u de plek aan waar u de pijn voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd, geeft de anesthesioloog door de huid een injectie met een verdovende vloeistof in het pijnpunt. De behandeling duurt slechts enkele minuten.

Complicaties/bijwerkingen

- Napijn kan er zijn op de plaats waar geprikt is. U kunt hiertegen een pijnstiller (paracetamol) nemen.
- Locale ontstekingsreactie (dit is zeldzaam).

Tenslotte

Afhankelijk van het effect kan deze behandeling worden herhaald. Vaak gebeurt dit door de huisarts of de behandelend arts.

Uitgebreide informatie vindt u in onze folder 'Zenuwblokkade'.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de Pijnpoli, telefoon 0485- 84 57 70.

De Pijnpoli bevindt zich op de begane grond, route 007.