

Gastroscoopie bij kinderen

In overleg met de behandelend kinderarts is besloten tot een gastroscoopie bij uw kind. Een gastroscoopie is een onderzoek waarmee de internist of de maag-darm-lever arts de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijkt. Het doel van dit onderzoek is om de oorzaak van de klachten van uw kind te onderzoeken. In deze folder leest u alles over het onderzoek en de voorbereiding daarop.

Gastroscoopie

Bij een gastroscoopie gebruikt de internist of de maag-darm-leverarts een endoscoop om de binnenkant van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm te bekijken. Een endoscoop is een soepele slang met aan het uiteinde een videocameraatje. Tijdens het onderzoek wordt de endoscoop via de mond, slokdarm en maag tot in de twaalfvingerige darm ingebracht. Op een beeldscherm kan de arts de binnenkant van de organen bekijken.

Vorbereiding

De voorbereiding is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de plaats waar de scopie zal plaatsvinden. Als de kinderarts bepaalt dat het onderzoek onder narcose moet plaatsvinden, dan zal de scopie op de operatiekamer uitgevoerd worden. Enkele weken van tevoren wordt u met uw kind verwacht op het pre-operatief spreekuur (POS) voor een gesprek met de anesthesist.

Als de scopie onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, zult u via de internist of de maag-darm-leverarts instructies meekrijgen over de voorbereiding. Het onderzoek vindt dan plaats op de scopiekamer.

In alle gevallen is het belangrijk dat de maag van uw kind leeg is. Daarom mag uw kind vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken. Dit gaat in overleg met de behandelend kinderarts en de anesthesist.

Opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de verpleegafdeling waar uw kind een aantal uren wordt opgenomen. Een verpleegkundige begeleidt uw kind naar een kamer. Uw kind krijgt een infuusnaaldje in een van de handen of een arm.

Onderzoek op de operatiekamer


Uw kind wordt naar de operatiekamer gebracht. Een van de ouders mag mee naar binnen totdat het kind slaapt. De anesthesioloog brengt uw kind in slaap met een kapje of een prik. Daarna wordt uw kind op de linkerzijde gelegd en wordt er een bijtring tussen de tanden geplaatst. Vervolgens wordt het onderzoek gestart.

Onderzoek op de scopiekamer

Uw kind wordt naar de scopiekamer gebracht. Een van de ouders mag mee naar binnen totdat het kind slaapt. Uw kind krijgt een slaapmiddel toegediend via een infuusnaaldje, waarna uw kind gaat slapen. Daarna wordt uw kind op de linkerzijde gelegd en wordt er een bijtring tussen de tanden geplaatst. Vervolgens wordt het onderzoek gestart. Uw kind zal tijdens het onderzoek nog wel reageren, maar weet er naderhand niets meer van.

Het verloop van het onderzoek

De internist of de maag-darm-leverarts schuift de endoscoop door de mond van uw kind via de slokdarm naar de maag en de twaalfvingerige darm om deze van binnen te bekijken. Om de maag beter te kunnen inspecteren, wordt er tijdens het onderzoek lucht (CO₂) in de maag geblazen. Het is normaal dat uw kind hierdoor lucht opboert. Soms neemt de arts kleine stukjes weefsel (biopten) af voor verder onderzoek. Tijdens en na het onderzoek wordt uw kind met behulp van een monitor bewaakt, totdat hij/zij goed wakker is.



Duur van het onderzoek

Het hele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Wanneer het onderzoek onder narcose plaatsvindt, duurt het ongeveer 30 minuten.

Complicaties

Een gastroscopie leidt vrijwel nooit tot complicaties.

Uw kind kan wel wat last krijgen van een pijnlijke keel. Doordat tijdens het onderzoek lucht in de maag geblazen wordt, kan uw kind ook nog enige tijd last hebben van een opgeblazen gevoel. Dit verdwijnt door te boeren en winden te laten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Soms kan de internist of de maag-darm-leverarts u direct na het onderzoek al een voorlopig verslag geven. Als er weefselstukjes (biopten) zijn weggenomen, duurt het ongeveer 7 werkdagen voordat de uitslag bekend is.

Nazorg

Uw kind wordt na afloop van het onderzoek weer teruggebracht naar de afdeling waar hij/zij is opgenomen. Uw kind kan na het onderzoek weer gewoon eten en drinken. Het is wel belangrijk dat uw kind dan goed wakker is. Uw kind mag naar huis als hij/zij voldoende is bijgekomen van het onderzoek.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en/of tijd verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met de polikliniek Interne Geneeskunde. Het telefoonnummer is 0485-84 53 60.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de Poli Interne Geneeskunde op telefoonnummer 0485-84 53 60.